


PREVENCIÓN DE LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO

*Mamá, papá y familia:
Ustedes, junto al equipo de salud que atiende
a su hijo prematuro, pueden hacer mucho
para cuidar la visión de su hijo.*

CONVIENE SABER QUE...

Cuanto más prematuro nace un bebé, menos desarrollada está su retina (capa más interna del ojo que permite ver) y tiene más riesgo de presentar una enfermedad llamada **Retinopatía del Prematuro (ROP)**.

Si su hijo prematuro necesita recibir oxígeno o presenta complicaciones, puede presentar una enfermedad ROP más grave.



Aunque en la mayoría de los casos, la ROP cura sin tratamiento y sin consecuencias, en algunos niños puede avanzar y llegar a producir ceguera.

Pero el control oportuno y el tratamiento adecuado pueden evitarla.

Por eso, **todos** los niños prematuros nacidos con menos de 1500 g de peso y con 32 semanas o menos de edad gestacional y aquellos de mayor peso y edad gestacional al nacer que reciban oxígeno o presenten complicaciones, **deben ser controlados siempre por un Oftalmólogo** mientras estén internados y siempre antes de irse de alta.



Todos los niños prematuros (de cualquier peso y edad gestacional) que necesitan oxígeno, deben estar controlados permanentemente con un aparato que se llama **saturómetro** para asegurar que reciben la cantidad de oxígeno que necesitan.

Para ello es necesario que las alarmas estén programadas de acuerdo a las recomendaciones.

SATURACIÓN ADECUADA DE OXÍGENO PARA NIÑOS PREMATUROS

ALARMA
MÍNIMA
DEL SATURÓMETRO
88%

SATURACIÓN
DESEADA
**89 a
94%**

ALARMA
MÁXIMA
DEL SATURÓMETRO
95%



MAMÁ, PAPÁ Y FAMILIA, RECUERDEN



Si su bebé prematuro necesita recibir Oxígeno, debe estar controlado siempre por un saturómetro. Si no lo tiene colocado, reclámelo.



Su hijo prematuro debe ser controlado por un Oftalmólogo mientras está internado y siempre antes de irse de alta si:

- nació con menos de 1500 g y 32 semanas o menos de edad gestacional
- fue más grande pero recibió oxígeno o tuvo complicaciones.

Si no es así, solicítelo.



Una vez que el bebé haya sido dado de alta de la internación, además de asistir a la consulta con el Pediatra o Neonatólogo, **es IMPRESCINDIBLE llevarlo a todos los controles** que el Oftalmólogo indique.

Es una responsabilidad de todos.